

Unser weiterer Leistungsumfang

Gesicht

Mini-Facelift, Facelift und Halsstraffung,
Oberlidplastik / Brauenlift, Unterlidplastik /
Tränensäcke, Faltenbehandlung (mit Botox,
Hyaluronsäure, Eigenfett), Fadenlifting,
Vampirneedling, Peeling, Ohrenkorrektur,
Nasenkorrektur

Brust

Breast Implant Illness (BII), Brustvergrößerung
mit Implantaten, Brustvergrößerung mit Eigenfett
(BEAULI™ Methode)*, Brustverkleinerung,
Bruststraffung, Brustaufbau nach Brustkrebs,
Gynäkomastie, Schlupfwarzen

Körper

Lipödem, Fettabsaugung, Laser Straffung,
Bauchdeckenstraffung,
Mummy Makeover, Bodylift,
Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung,
Schweißdrüsenbehandlung (miraDry®),
Povergrößerung mit Eigenfett*), Schamlippenkorrektur,
Magenballon

Haut

Hautveränderung, Narbenkorrektur, Laserbehandlung

**) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella
ein Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels
Wasserstrahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte
BEAULI™ Methode. Mit Hilfe dieser Fettzellen wird Ihre Brust
auf natürlichem Weg vergrößert.*

Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:
www.park-klinik-birkenwerder.de

Unsere Adressen

Park-Klinik Birkenwerder

Hubertusstraße 22
16547 Birkenwerder bei Berlin
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

info@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de



Park-Klinik Berlin

Rykestraße 50
10405 Berlin (Prenzlauer Berg)
Tel. +49 (0) 30 40 36 71 59

info@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de



park_klinik



parkklinikbirkenwerder



Brustvergrößerung mit Implantaten

Alle unsere Fachärzte sind ordentliche Mitglieder in u.a. folgenden
Vereinigungen für Plastische und Ästhetische Chirurgie:



Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie

PARK-KLINIK BIRKENWERDER

Brustvergrößerung mit Implantaten

Diagnose

Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass das Brustwachstum während der Pubertät ab einem Punkt aufhört und sich keine ausreichende Brustgröße entwickelt. Ebenso können bestimmte Lebensumstände wie starke Gewichtsabnahme, Stillen, Alterungsprozess zu einem Verlust an Brustvolumen führen, so dass eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild entsteht.

Eine Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten kann durch eine Volumenvergrößerung der Brust zu einem harmonischeren Körperbild verhelfen und damit die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper wieder herstellen.

Operation

Verschiedene Zugangswege können gewählt werden, um das Brustimplantat in die Brust einzusetzen. Hier wenden wir in der Regel den sogenannten inframammaren Zugang, also den in der Unterbrustfalte an. Die Narbe ist schön versteckt und später nahezu unsichtbar. Zudem ermöglicht uns dieser Zugang eine optimale Sicht, so dass wir ganz sicher in den anatomischen Schichten operieren können. Je nach Ausgangsbefund wird das Implantat über oder unter den Muskel gelegt. Die Größe und Form des Implantates hängt von der Brustform, der Thoraxform und den weiteren anatomischen Gegebenheiten ab.

Risiken & Komplikationen

Neben den allgemeinen Risiken jeder Operation wie Nachblutung, Infektion oder störender Narbenbildung kann es vereinzelt zu Verletzungen von Haut- und Muskelnerven kommen, welche sich aber selbsttätig innerhalb weniger Wochen regenerieren. Langfristig kann sich eine Kapsel-fibrose entwickeln. Durch unsere schonende Operationsmethode sind Komplikationen extrem selten.

Narkose und Klinikaufenthalt

Die Brustvergrößerung wird in Vollnarkose operiert. Dafür müssen spätestens am Vortag Ihres Termins die notwendigen Untersuchungen durchgeführt und die Narkose mit dem Anästhesisten besprochen werden. Der Klinikaufenthalt liegt bei ein bis zwei Tagen. Aufstehen ist schon unmittelbar nach der OP wieder erlaubt, Duschen und Haare waschen nach dem ersten Verbandswechsel am zweiten Tag.

OP-Dauer:	ca. 60-90 Minuten
Narkose:	Vollnarkose
Aufenthaltsdauer:	1-2 Nächte stationär
Kosten:	ab 6.200 Euro

Alle Preise inkl 19% Mehrwertsteuer, zzgl. Anästhesie

Nachbehandlung

Postoperativ soll ein Kompressions-BH für 2 Wochen 24 Stunden getragen werden. Nach dieser Zeit empfehlen wir, den BH tagsüber weitere 2 Wochen zu tragen und sich körperlich in dieser Zeit zu schonen.



Dr. med. Ursula Tanzella
Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie



Dr. med. Klaus Ueberreiter
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie



Dr. med. Anna Jastak
Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie



Dr. med. Armin Bell
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie