

Unser weiterer Leistungsumfang

■ Gesicht

Facelift und Halsstraffung, Augenlidkorrektur/
Brauenlift, Faltenbehandlung (mit Botox,
Hyaluronsäure, Eigenfett, Eigenblut-PRP-Plasma),
Fadenlifting, Needling, Peeling, Ohrenkorrektur

■ Brust

Brustvergrößerung mit Implantaten,
Brustvergrößerung /-aufbau mit Eigenfett (BEAULI™
Methode)*, Brustverkleinerung, Bruststraffung,
Brustkorrektur, Brustwiederaufbau nach Brustkrebs,
Gynäkomastie, Schlupfwarzen

■ Körper

Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung,
Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung,
Povergrößerung mit Eigenfett*),
Schamlippenkorrektur,
Schweißdrüsenbehandlung mit miraDry®,
Arthrose-Fettstammzellentherapie

■ Haut

Hautveränderung, Narbenkorrektur,
Laserbehandlung,

*) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella ein
Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels Wasser-
strahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte BEAULI™ Methode.


Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:
www.park-klinik-birkenwerder.de

Unsere Adressen

Park-Klinik Birkenwerder

Hubertusstraße 22
D-16547 Birkenwerder bei Berlin
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

info@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de



Außensprechstunden in Berlin

Praxis Grunewald
im Haut- und Laserzentrum Berlin Grunewald
Richard-Strauss-Str. 27, 14193 Berlin
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0

Gesundheitszentrum - Potsdamer Platz
Eichhornstraße 2 / Ecke Linkstrasse
10785 Berlin-Mitte
Tel. +49 (0)30-259 250



Bauchdeckenstraffung



PARK-KLINIK BIRKENWERDER
Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie



Bauchdeckenstraffung

Diagnose

Die Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik) ist immer dann sinnvoll, wenn auf Grund einer Überdehnung die elastischen Fasern der Haut zerstört wurden und der geweitete Hautmantel deswegen überhängt. Häufig kommt das nach starker Gewichtsabnahme oder manchmal nach einer Schwangerschaft vor. Es entstehen so genannte Fettschürzen, die durch die Elastizität der Haut und des Unterhautgewebes nicht mehr ausreichend gestrafft werden können. Auch eine genetisch bedingte Bindegewebschwäche oder eine mehr oder weniger ausgeprägte Verdickung der Fettschicht können zum Überhängen der Bauchhaut führen.



Pat. A

Operation

Eine Bauchdeckenstraffung erfolgt in der Regel unter Allgemeinanästhesie (Narkose), je nach Art und Größe des Hautüberschusses bzw. des Fettüberschusses sind verschiedene Schnittführungen möglich. Entweder reicht ein waagerechter Schnitt an der Schamhaargrenze, oder es muss bei größerem Haut- und Fettüberschuss der waagerechte Schnitt durch einen senkrechten Schnitt erweitert werden, damit ein Ergebnis ohne Falten möglich wird. Der Narbenverlauf entspricht in diesem Fall einer Art Anker. Der Nabel meist ausgeschnitten und weiter oben wieder eingenäht. Bestehen gleichzeitig Bauchwandbrüche (Hernien), eine Schwäche der Bauchmuskeln (Rektusdiastase) oder Narben am Unterbauch, so können diese im Rahmen einer Bauchdeckenstraffung ebenfalls korrigiert werden.

Risiken & Komplikationen

Neben den allgemeinen chirurgischen Komplikationen wie Infektion, Blutung und Wundheilstörung kann es in seltenen Fällen bei dieser Operation – insbesondere bei Rauchern – zu Durchblutungsstörungen des Gewebes im Bereich des Nabels und der Wundränder kommen.

Narkose und Klinikaufenthalt

Die Bauchdeckenstraffung wird in Vollnarkose operiert werden. Dafür müssen spätestens am Vortag Ihres Termins die notwendigen Untersuchungen durchgeführt und die Narkose mit dem Anästhesisten besprochen werden.

Der Klinikaufenthalt liegt bei ein bis zwei Tagen. Aufstehen ist schon unmittelbar nach der OP wieder erlaubt, Duschen nach dem ersten Verbandswechsel.

OP-Dauer:	45–120 Minuten
Narkose:	Vollnarkose
Aufenthaltsdauer:	1–2 Nächte stationär
Kosten:	ab 3.400 Euro

Alle Preise inkl 19% Mehrwertsteuer, zzgl. Anästhesie

Nachbehandlung

Nach der Operation in der Park-Klinik Birkenwerder b. Berlin sollte für mindestens 4 Wochen ein spezielles Kompressionsmieder getragen werden. Es stabilisiert die zusammengenähte gerade Bauchmuskulatur und verhindert zu starke Scher- und Zugkräfte auf die Narben. Die Narben verblassen langsam über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren.



Pat. B



Dr. med. Klaus Ueberreiter
Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie



Dr. med. Ursula Tanzella
Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie



Dr. med. Anna Jastak
Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie



Parshanak Azdasht
Weiterbildungsassistentin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie