

## Unser weiterer Leistungsumfang

### ■ Gesicht

Facelift und Halsstraffung, Augenlidkorrekturen/ Brauenlift, Eigenfett Gesicht, Faltenbehandlung (mit Botox / Hyaluronsäure, PRP - „Vampirlift“ -, Fadenlift, Needling -mit HY, Blutplasma-), Fruchtsäurepeeling, Lippenmodellierung, Ohrenkorrektur

### ■ Brust

Brustvergrößerung, Brustaufbau mit Eigenfett (BEAULI™ Methode)\*, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Gynäkomastie, Schlupfwarzen

### ■ Körper

Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, Oberarmstraffung / Oberschenkelstraffung, Povergrößerung mit Eigenfett\*), Schamlippenverkleinerung, Schweißdrüsenentfernung (miraDry®)

### ■ Haare

Eigenhaartransplantation u.v.m.


\*) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella ein Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels Wasserstrahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte BEAULI™ Methode.

## Unsere Adressen

### Park-Klinik Birkenwerder

Hubertusstraße 22  
D-16547 Birkenwerder bei Berlin  
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0  
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

info@park-klinik-birkenwerder.de  
www.park-klinik-birkenwerder.de



## Brustvergrößerung mit Silikon

### Außensprechstunden in Berlin

Praxis Grunewald  
im Haut- und Laserzentrum Berlin Grunewald  
Richard-Strauss-Str. 27, 14193 Berlin  
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0

Gesundheitszentrum - Potsdamer Platz  
Eichhornstraße 2 / Ecke Linkstrasse  
10785 Berlin-Mitte  
Tel. +49 (0)30-259 250

Haus Cumberland - Kurfürstendamm  
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin  
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0

Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:  
[www.park-klinik-birkenwerder.de](http://www.park-klinik-birkenwerder.de)



PARK-KLINIK BIRKENWERDER  
Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie



## Brustvergrößerung mit Silikon

### Diagnose

Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass das Brustwachstum während der Pubertät ab einem Punkt aufhört und sich keine ausreichende Brustgröße entwickelt. Ebenso können bestimmte Lebensumstände wie starke Gewichtsabnahme, Stillen, Alterungsprozess zu einem Verlust an Brustvolumen führen, so dass eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild entsteht. Eine Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten kann durch eine Volumenvergrößerung der Brust zu einem harmonischeren Körperbild verhelfen und damit die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper wieder herstellen.

### Operation

Verschiedene Zugangswege können gewählt werden, um das Brustimplantat in die Brust einzusetzen. Hier wenden wir in der Regel den sogenannten inframammären Zugang, also den in der Unterbrustfalte an. Die Narbe ist schön versteckt und später nahezu unsichtbar. Zudem ermöglicht uns dieser Zugang eine optimale Sicht, so dass wir ganz sicher in den anatomischen Schichten operieren können. Je nach Ausgangsbefund wird das Implantat über oder unter den Muskel gelegt. Die Größe und Form des Implantates hängt von der Brustform, der Thoraxform und den weiteren anatomischen Gegebenheiten ab.

### Risiken & Komplikationen

Neben den allgemeinen Risiken jeder Operation wie Nachblutung, Infektion oder störender Narbenbildung kann es vereinzelt zu Verletzungen von Haut- und Muskelnerven kommen, welche sich aber selbsttätig innerhalb weniger Wochen regenerieren. Langfristig kann sich eine Kapselbildung entwickeln. Durch unsere schonende Operationsmethode sind Komplikationen extrem selten.

### Narkose und Klinikaufenthalt

Die Brustvergrößerung wird in Vollnarkose operiert. Dafür müssen spätestens am Vortag Ihres Termins die notwendigen Untersuchungen durchgeführt und die Narkose mit dem Anästhesisten besprochen werden. Der Klinikaufenthalt liegt bei ein bis zwei Tagen. Aufstehen ist schon unmittelbar nach der OP wieder erlaubt, Duschen und Haare waschen nach dem ersten Verbandswechsel am zweiten Tag.

<b>OP-Dauer:</b>	<b>ca. 60–90 Minuten</b>
<b>Narkose:</b>	<b>Vollnarkose</b>
<b>Aufenthaltsdauer:</b>	<b>1–2 Nächte stationär</b>
<b>Kosten:</b>	<b>ab 5.600 Euro</b>

*Alle Preise inkl 19% Mehrwertsteuer, zzgl. Anästhesie*

### Nachbehandlung

Postoperativ soll ein Kompressions-BH für 2 Wochen 24 Stunden getragen werden. Nach dieser Zeit empfehlen wir, den BH tagsüber weitere 2 Wochen zu tragen und sich körperlich in dieser Zeit zu schonen.



**Dr. med.  
Klaus Ueberreiter**  
Facharzt für plastische,  
ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie



**Dr. med.  
Ursula Tanzella**  
Fachärztin für plastische,  
ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie



**Dr. med.  
Anna Jastak**  
Fachärztin für plastische,  
ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie



**Dr. med.  
Sophia Bethge**  
Fachärztin für plastische,  
ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie