

## Unser weiterer Leistungsumfang

### ■ Gesicht

Mini-Facelift, Facelift und Halsstraffung, Oberlidplastik / Brauenlift, Unterlidplastik / Tränensäcke, Faltenbehandlung mit Botox, Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure, Faltenbehandlung mit Eigenfett Gesicht, Faltenbehandlung mit Eigenblut (PRP / „Vampirlift“), Fadenlifting, Needling, Peeling, Ohrenkorrektur, Nasenkorrektur

### ■ Brust

Breast Implant Illness (BII), Brustvergrößerung mit Implantaten, Brustvergrößerung mit Eigenfett (BEAULI™ Methode)\*, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Brustaufbau nach Brustkrebs, Gynäkomastie, Schlupfwarzen

### ■ Körper

Lipödem, Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, Mummy Makeover, Bodylift, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Schweißdrüsenbehandlung (miraDry®), Povergrößerung mit Eigenfett\*), Schamlippenkorrektur, Intimchirurgie für Männer, Magenballon

### ■ Haut

Hautveränderung, Narbenkorrektur, Laserbehandlung

\*) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella ein Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels Wasserstrahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte BEAULI™ Methode.

Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:  
[www.park-klinik-birkenwerder.de](http://www.park-klinik-birkenwerder.de)

## Unsere Adressen

### Park-Klinik Birkenwerder


Hubertusstraße 22  
D-16547 Birkenwerder bei Berlin  
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0  
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

info@park-klinik-birkenwerder.de  
www.park-klinik-birkenwerder.de

park\_klinik



parkklinikbirkenwerder



## Außensprechstunden in Berlin

### Natural Aesthetics Berlin

(Stadtpräsentanz der  
Park-Klinik Birkenwerder)  
Rykestraße 50  
10405 Berlin (Prenzlauer Berg)  
Tel. +49 (0) 30 40 36 71 59

info@natural-aesthetics.berlin  
www.natural-aesthetics.berlin



mit  
Lipödem

ohne  
Lipödem

Lipödem



PARK-KLINIK BIRKENWERDER  
Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie



## Lipödem

### Vorbereitung

Ist die Diagnosestellung bereits durch einen auswärtigen Facharzt bzw. Phlebologen erfolgt, sollte eine gefäßchirurgische Untersuchung mittels Duplexsonographie durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Krampfadern auszuschließen bzw. rechtzeitig vor einer operativen Therapie des Lipödems zu behandeln. Anschließend sollte bereits vier Wochen vor dem Eingriff eine entstauende Kompressionstherapie mit entsprechender Flachstrickkompressionswäsche und manueller Lymphdrainage (MLD) eingeleitet worden sein.

### Operation

Inzwischen gilt die von uns seit Jahren eingesetzte Wasserstrahl assistierte Liposuktion (WAL) als etabliertestes Verfahren. Hierbei wird über einen kleinsten Hautschnitt zunächst eine schmerz- und blutstillende Lösung in das betroffene Fettgewebe eingespritzt, um es anschließend gleichmäßig abzusaugen. Die Menge an abgesaugtem Fett ist individuell sehr unterschiedlich und abhängig vom abzusaugenden Areal. Erfahrungsgemäß entspricht dies etwa 5–7% des Körpergewichts. Sind größere Areale betroffen, kann die Therapie in einer weiteren Sitzung im Abstand von sechs bis acht Wochen erfolgen.

### Risiken und Nebenwirkungen

Insgesamt handelt es sich um einen sehr risikoarmen Eingriff. Vereinzelt können kleine Konturunregelmäßigkeiten (Dellen) im Bereich der abgesaugten Areale auftreten. Üblicherweise entstehen jedoch im Bereich der abgesaugten Areale lediglich Blutergüsse und muskelkaterartige Beschwerden, welche sich innerhalb von Wochen spontan zurückbilden.

<b>OP-Dauer:</b>	<b>ca. 90 Minuten pro Sitzung</b>
<b>Narkose:</b>	<b>Dämmerschlaf oder Vollnarkose</b>
<b>Aufenthaltsdauer:</b>	<b>1 Nacht stationär</b>

---

**Kosten:** erste Behandlung ab 4.400 EUR  
jede weitere Sitzung ab 3.400 EUR\*

*\*) Alle Preise zzgl. Anästhesie*

### Narkose und Klinikaufenthalt

Die Absaugung erfolgt in Dämmerschlaf- oder Vollnarkose mit einem anschließenden kurzen stationären Aufenthalt von einer Übernachtung.

### Nachbehandlung

Direkt im Anschluss an Ihren Eingriff werden die abgesaugten Areale elastisch gewickelt und im Verlauf durch Ihre Kompressionskleidung ersetzt, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Diese muss etwa zwei Wochen 24 Stunden täglich und weitere zwei Wochen zwölf Stunden täglich getragen werden.

Einen Tag nach Ihrem Eingriff können Sie die Kompressionswäsche zum Duschen ablegen.

Ihre Kontrolluntersuchung findet etwa eine Woche nach Ihrem Eingriff statt.

---

### Checkliste

- Gefäßchirurgische Untersuchung der Gefäße und ggf. Therapie
  - Flachstrickkompressionskleidung
  - Manuelle Lymphdrainage
- 



**Dr. med.  
Ursula Tanzella**

Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.  
Klaus Ueberreiter**

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.  
Anna Jastak**

Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.  
Pouyan Yary**

Weiterbildungsassistent für Plastische und Ästhetische Chirurgie