

Unser weiterer Leistungsumfang

■ Gesicht

Mini-Facelift, Facelift und Halsstraffung, Oberlidplastik / Brauenlift, Unterlidplastik / Tränensäcke, Faltenbehandlung mit Botox, Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure, Faltenbehandlung mit Eigenfett Gesicht, Faltenbehandlung mit Eigenblut (PRP / „Vampirelift“), Fadenlifting, Needling, Peeling, Ohrenkorrektur, Nasenkorrektur

■ Brust

Breast Implant Illness (BII), Brustvergrößerung mit Implantaten, Brustvergrößerung mit Eigenfett (BEAULI™ Methode)*, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Brustaufbau nach Brustkrebs, Gynäkomastie, Schlupfwarzen

■ Körper

Lipödem, Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, Mummy Makeover, Bodylift, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Schweißdrüsenbehandlung (miraDry®), Povergrößerung mit Eigenfett*), Schamlippenkorrektur, Magenballon

■ Haut

Hautveränderung, Narbenkorrektur, Laserbehandlung

*) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella ein Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels Wasserstrahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte BEAULI™ Methode.

Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:
www.park-klinik-birkenwerder.de

Unsere Adressen

Park-Klinik Birkenwerder


Hubertusstraße 22
D-16547 Birkenwerder bei Berlin
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

info@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de

park_klinik



parkklinikbirkenwerder



Außensprechstunden in Berlin

Natural Aesthetics Berlin

(Stadtrepräsentanz der
Park-Klinik Birkenwerder)
Rykestraße 50
10405 Berlin (Prenzlauer Berg)
Tel. +49 (0) 30 40 36 71 59

info@natural-aesthetics.berlin
www.natural-aesthetics.berlin



Oberarmstraffung



PARK-KLINIK BIRKENWERDER
Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie



Oberarmstraffung

Diagnose

Die Oberarmstraffung – auch Brachioplastik genannt – wird durchgeführt, wenn an den Oberarmen ein Hautüberschuss besteht. Der Hautüberschuss ist meist Folge einer schnellen und starken Abnahme des Gewichtes. Ein anderer Grund liegt in der Bindegewebserschaffung innerhalb des Prozesses der Alterung. Einige Patienten können im Zuge des Hautüberschusses auch an funktionellen Beschwerden leiden, bspw. können Hautentzündungen entstehen.

Operation

Die Schnittführung und -länge hängen davon ab, wie viel überschüssige Haut entfernt werden. Im Allgemeinen erfolgt der Hautschnitt entweder auf der Innen- oder auf der Hinterseite des Oberarms. Er erstreckt sich maximal von der Achselhöhle bis knapp vor dem Ellbogen, kann aber auch deutlich kürzer sein. Ganz verstecken lässt sich der Schnitt allerdings nicht, an der Unterseite des Oberarms bleibt eine feine Narbe zurück. Bei Bedarf wird die Entfernung der Haut mit einer Fettabsaugung (Liposuktion) verbunden. Anschließend strafft der Chirurg das unter der Haut liegende Stützgewebe mithilfe von inneren Nähten und fixiert die Haut glatt über der neuen Kontur Ihres Oberarms. Der Hauteinschnitt wird mit resorbierbaren Fäden, die sich mit der Zeit auflösen und das Ziehen überflüssig machen, verschlossen.

Risiken & Komplikationen

Alle operativen Eingriffe können Risiken und Komplikationen mit sich ziehen. Dazu gehören ggf. ungünstige Narbenbildung, Blutungen (Hämatome) sowie Wundheilungsstörungen.

Narkose und Klinikaufenthalt

Die Oberarmstraffung wird in Vollnarkose operiert werden. Dafür müssen spätestens am Vortag Ihres Termins die notwendigen Untersuchungen durchgeführt und die Narkose mit dem Anästhesisten besprochen werden. Anstelle einer elastischen Binde erhalten Sie von uns einen Kompressionsbolero. Aufstehen ist schon unmittelbar nach der OP wieder erlaubt, Duschen nach dem ersten Verbandwechsel am zweiten Tag. Die Operation dauert ca. 2–3 Stunden. Sie bleiben ein bis zwei Nächte bei uns auf der Station.

OP-Dauer:	ca. 60 Minuten
Narkose:	Vollnarkose
Aufenthaltsdauer:	1–2 Nächte stationär
Kosten:	ab 4.100 Euro

Alle Preise inkl 19% Mehrwertsteuer, zzgl. Anästhesie

Nachbehandlung

Bei der Oberarmstraffung dürfen Sie mit einem unmittelbaren Erfolgserlebnis rechnen: Die überschüssige Haut ist weg und die straffere Linie des Oberarms ist auch dann bereits gut zu erkennen, wenn mögliche Schwellungen und Blutergüsse noch abklingen müssen. Der Erfolg Ihrer Oberarmstraffung ist umso größer, je sorgfältiger Sie in der Heilungsphase mitarbeiten. So ist es beispielsweise wichtig, die Schnittlinien keinen übermäßigen Belastungen, Schürfungen oder Bewegungen auszusetzen. Der Kompressionsbolero sollte für ungefähr 4 Wochen getragen werden.



**Dr. med.
Ursula Tanzella**
Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.
Klaus Ueberreiter**
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.
Anna Jastak**
Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.
Pouyan Yary**
Weiterbildungsassistent
für Plastische und
Ästhetische Chirurgie