

Unser weiterer Leistungsumfang

■ Gesicht

Mini-Facelift, Facelift und Halsstraffung, Oberlidplastik / Brauenlift, Unterlidplastik / Tränensäcke, Faltenbehandlung mit Botox, Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure, Faltenbehandlung mit Eigenfett Gesicht, Faltenbehandlung mit Eigenblut (PRP / „Vampirlift“), Fadenlifting, Needling, Peeling, Ohrenkorrektur, Nasenkorrektur

■ Brust

Breast Implant Illness (BII), Brustvergrößerung mit Implantaten, Brustvergrößerung mit Eigenfett (BEAULI™ Methode)*, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Brustaufbau nach Brustkrebs, Gynäkomastie, Schlupfwarzen

■ Körper

Lipödem, Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, Mummy Makeover, Bodylift, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Schweißdrüsenbehandlung (miraDry®), Povergrößerung mit Eigenfett*), Schamlippenkorrektur, Intimchirurgie für Männer, Magenballon

■ Haut

Hautveränderung, Narbenkorrektur, Laserbehandlung

*) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella ein Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels Wasserstrahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte BEAULI™ Methode.

Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:
www.park-klinik-birkenwerder.de

Unsere Adressen

Park-Klinik Birkenwerder


Hubertusstraße 22
D-16547 Birkenwerder bei Berlin
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

info@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de

park_klinik



parkklinikbirkenwerder



Außensprechstunden in Berlin

Natural Aesthetics Berlin

(Stadtpräsentanz der
Park-Klinik Birkenwerder)
Rykestraße 50
10405 Berlin (Prenzlauer Berg)
Tel. +49 (0) 30 40 36 71 59

info@natural-aesthetics.berlin
www.natural-aesthetics.berlin



Oberschenkelstraffung



PARK-KLINIK BIRKENWERDER
Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie



Oberschenkelstraffung

Die Oberschenkelstraffung ist ein operatives Verfahren zur Straffung und Verbesserung der Kontur im Bereich der Oberschenkel. Sie ist eine geeignete Methode, wenn die Hautelastizität an den Beinen nachgelassen hat und der Fettanteil eher gering ist. Bei ausgeprägtem Fettanteil kann die Straffung mit einer Fettabsaugung kombiniert werden.

Eine Oberschenkelstraffung ist dann angezeigt, wenn es einen erheblichen Hautüberschuss an den Oberschenkeln gibt. Der Hautüberschuss ist meist Folge einer schnellen und starken Gewichtsabnahme. Ein weiterer Anlass für die Straffung liegt in der Bindegewebser-schlaffung im Rahmen des Alterungsprozesses. Manche Menschen leiden in Folge des Hautüberschusses auch an funktionellen Beschwerden, wie z.B. Hautentzündungen oder Bewegungseinschränkungen.

Operation

Bei der Oberschenkelstraffung wird durch eine Schnittführung an der Innenseite des Schenkels die zwischen Schambereich und Knie herabhängende Haut entfernt und der Oberschenkel neu geformt. Bei Bedarf wird die Entfernung der Haut mit einer Fettabsaugung verbunden. Anschließend strafft der Chirurg das unter der Haut gelegene Stützgewebe mithilfe von inneren Nähten und fixiert die Haut glatt über der neuen Kontur des Oberschenkels. Der Hautschnitt wird mit selbstauflösenden Fäden verschlossen und zur optimalen Heilung zusätzlich mit Hautkleber und/ oder Hautklebestreifen gesichert. Ein Erfolgserlebnis ist schon unmittelbar nach dem Eingriff zu sehen, da die überschüssige Haut entfernt wurde und die straffe Linie des Oberschenkels bereits gut zu erkennen ist. Wenn nötig, so strafft man auch die Außenseite im Rahmen eines Bodylifts. Dabei wird auch das Gesäß mit angehoben.

Risiken & Komplikationen

Alle operativen Eingriffe führen Risiken und Komplikationen mit sich. Dazu gehören ungünstige Narbenbildung, Blutungen (Hämatome) sowie Wundheilungsstörungen.

Narkose und Klinikaufenthalt

Der Narkosearzt bespricht vorab mit Ihnen die für Sie am besten geeignete Betäubungsmethode. In der Regel empfehlen wir bei der Oberschenkelstraffung eine Vollnarkose. Die Operation dauert ca. 2–3 Stunden. Sie bleiben 1–2 Nächte bei uns auf der Station.

OP-Dauer: 90–120 Minuten

Narkose: Vollnarkose

Aufenthaltsdauer: 1–2 Nächte stationär

Kosten: ab 4.600 Euro

Alle Preise inkl 19% Mehrwertsteuer, zzgl. Anästhesie

Nachbehandlung

Nach einer Oberschenkelstraffung dürfen die Schnittlinien keinen übermäßigen Belastungen, Schürfungen oder Bewegungen ausgesetzt werden. Wir empfehlen das Tragen von Kompressionswäsche für 4–6 Wochen. Unter Umständen erhalten Sie Salben und Medikamente, die die Regeneration unterstützen und das Risiko einer Infektion zu vermeiden helfen.



**Dr. med.
Ursula Tanzella**

Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.
Klaus Ueberreiter**

Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.
Anna Jastak**

Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie



**Dr. med.
Pouyan Yary**

Weiterbildungsassistent
für Plastische und
Ästhetische Chirurgie